



Полтавський державний медичний університет


Протезування деформації лицевої ділянки. Ектопротези







Дефекти твердого і м'якого піднебіння можуть бути вродженими та набутими. За даними М.Д.Дубова, вроджені аномалії верхньої щелепи складають 12-30% від усіх вад розвитку та 77% — від усіх розщелин лиця. Так, за статистичними даними авторів різних країн, з незрощеним піднебінням народжується 1 дитина на 600-1000 новонароджених. Спостерігається тенденція до зростання даного виду патології.






Вроджені незрощення піднебіння мають різну локалізацію, бувають різної форми та розмірів. Спостерігаються ізольовані незрощення твердого піднебіння, незрощення твердого піднебіння у поєднанні з незрощенням м'якого піднебіння та губи.

Незрощення бувають однобічні та двобічні. На тканинах піднебіння у разі вроджених незрощень спайок немає. Дефекти, набуті в результаті сифілітичного ураження, найчастіше локалізуються на твердому піднебінні і значно рідше — на м'якому.





Найчастіше в практиці стоматолога-ортопеда зустрічаються набуті дефекти піднебіння. Поява цих дефектів зумовлена здебільшого травматичним фактором (вогнепальні поранення), рідше такі дефекти з'являються внаслідок оперативних втручань (резекція в результаті онкологічних новоутворень).



Сліпа вогнепальна травма




Ракова пухлина





Виготовлення металевого протезу для заміщення дефекту твердого піднебіння








Обтураторы с подвижной небной занавеской: 1) Kingsley, 2) Brugger, 3) Guerini, 4) Delair, 5) Ruppe-Chastel, 6) Mitchell, 7) Sercomb, 8) Herris, 9) Хрущева, 10) Kingsley, 11) Martin, 12) Warnekros.



Обтураторы твердого неба: а – обтуратор “запонка”, б – обтуратор с губкой, в – обтуратор Fauchard



Обтураторы твердого и мягкого неба,
а — по Сюерсену; б — по Шильдскому; в — по Кезу.